

Pain Relief Cream

MEDICINAL INGREDIENTS PER DOSE / Ingrédients médicinaux par dose :

Methyl salicylate (2-Hydroxybenzoic acid methyl ester) / Salicylate de méthyle (ester de méthyle d'acide 2-hydroxybenzoïque)	14%
dl-menthol (<i>Mentha arvensis</i> - leaf) / dl-menthol (<i>Mentha arvensis</i> - feuille)	7%

NON-MEDICINAL INGREDIENTS / Ingrédients non médicinaux :

Purified water / eau purifiée, glyceryl stearate / stéarate de glycérile, butylene glycol / butène glycol-1,3, glycerin / glycérine, polysorbate 80 / polysorbate 80, stearic acid / acide stéarique, behenyl alcohol / alcool béhélénique, methylsulfonylmethane / méthylsulfonylméthane, allantoin / allantoïne, chondroitin sulfate sodium / sodium de sulfate de chondroïtine, glucosamine sulfate / sulfate de glucosamine, disodium EDTA / EDTA disodique, acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer / acrylates / crosspolymère d'acrylate d'alkyle C10-30, aminomethyl propanol / propanol d'aminométhyle, caprylyl glycol / caprylyle de glycol, phenoxyethanol / phénoxyéthanol, *Arnica montana* flower extract / extrait de fleur d'*Arnica montana*

Cautions/Warnings: Consult a health care practitioner prior to use:

- If you are pregnant or breastfeeding.
- If you are taking anticoagulant medications.

Consult a health care practitioner for use beyond 7 days. Keep out of reach of children. If overdose or accidental ingestion occurs, call a Poison Control Center immediately. Discontinue use and consult a health care practitioner if symptoms persist and/or worsen after 7 days or re-occur within a few days. Rashes and/or burning discomfort have been known to occur; in which case, discontinue use. Hypersensitivity such as allergy has been known to occur; in which case, discontinue use.

Mises en garde / Avertissements : Consulter un professionnel de la santé avant d'utiliser le produit :

- Si vous êtes enceinte ou allaitante.
- Si vous prenez des anticoagulants.

Consulter un praticien de soins de santé pour un usage de plus de 7 jours. Tenir hors de portée des enfants. En cas de surdose ou d'ingestion accidentelle, communiquer immédiatement avec un centre antipoison. Si les symptômes persistent et / ou s'aggravent pendant plus de 7 jours, ou disparaissent pour réapparaître quelques jours plus tard, cesser l'emploi et consulter un praticien de soins de santé. En cas d'irritation et/ou de sensation de brûlure, cesser l'usage. En cas d'hypersensibilité, telle une allergie, cesser l'utilisation.